



A Comisión Autónoma Central de Farmacia e Terapéutica (CACFT) reunida en data 21 de novembro de 2013, á vista da solicitude de avaliación formulada pola Comisión para o tratamento da Esclerose Múltiple, **CONSIDERA PERTINENTE**, de acordo á instrución 4/2010 do 26 de abril da Xerencia do Servizo Galego de Saúde, a inclusión na guía farmacoterapéutica das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde, do medicamento considerado de alto impacto, sanitario, social e económico:

FAMPRIDINA

na indicación de mellora da marcha en pacientes adultos con esclerose múltiple con discapacidade na marcha (EDSS 4-7), e conforme ao **indicado no PROTOCOLO adxunto**.

Santiago de Compostela, 29 de novembro de 2013

O PRESIDENTE DA COMISIÓN AUTONÓMICA CENTRAL DE FARMACIA E TERAPÉUTICA

D. Félix Rubial Bernardez

COMISIÓNS DE FARMACIA E TERAPÉUTICA DOS CENTROS HOSPITALARIOS DO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE





PROTOCOLO DE TRATAMIENTO CON FAMPRIDINA EN PACIENTES CON ESCLEROSE MÚLTIPLE

Na mellora da marcha en pacientes adultos con EM con discapacidade na marcha (EDSS 4-7), que amosaron unha melloría clinicamente relevante durante un período inicial de proba do tratamento de 2 semanas.

- Idade igual ou maior a 18 anos
- Diagnóstico de EM (RR, SP ou PP)
- EDSS: 4.0-7.0
- Aclaramento de creatinina > 80 ml/min
- Sen historia previa de crisis epilépticas
- **Sen tratamento con medicamentos inhibidores de OCT2**

VALORACIÓN BASAL:

1. Timed 25 Foot Walk (T25FW)
2. MS Walking Scale -12 (MSWS-12)

FAMPRIDINA 10 mg/12 horas

VALORACIÓN ÁS 2 SEMANAS

Melloría superior a un 20% na velocidade da marcha (T25FW)

E

Melloría de alo menos 6 puntos na escala MSWS-12

NON

NON RESPONDEDOR

SUSPENDER TRATAMENTO

SEGUIMENTO HABITUAL DA EM

SI

RESPONDEDOR

MANTER TRATAMENTO

AVALIACIÓN AOS 3 MESES E SEGUIMENTO AOS 6 MESES
A continuación do tratamento verase condicionada polo mantemento da eficacia:

Melloría superior a un 20% na velocidade da marcha (T25FW)

E

Melloría de alo menos 6 Puntos na escala MSWS-12

