PROBAS DIAGNÓSTICAS E TIPO DE MOSTRAS PARA CHIKUNGUNYA, ZIKA E DENGUE				
		CHIKUNGUNYA	**ZIKA**	**DENGUE**
Día de recollida dende o inicio de síntomas	**0 - 5º**	Cultivo e PCR	Cultivo e PCR	Cultivo, PCR e antíxeno. IgM (ELISA) :4º-5º día
	5º - 7º	PCR e seroloxía	PCR e seroloxía	Antíxeno e seroloxía
	A partir do 7º	Seroloxía	Seroloxía	Antíxeno (ata o 10º) e seroloxía
		Se a mostra se extraeu antes do 7º día e resultou negativa: repetir 10 días despois	Se a mostra se extraeu antes do 7º día e resultou negativa: repetir 10 días despois	Se a mostra se extraeu antes do 7º día e resultou negativa: repetir 10 días despois
		Se acude despois do 7º día, ademais desta 1ª mostra recoller unha segunda 15 días despois		1º soro e >14 días despois 2º soro
	0 - 20º		Cultivo e PCR en mostra de ouriños	
			Nas embarazadas hai que confirmar por neutralización os resultados positivos tanto da IgM como da IgG	
			Nalgunhas embarazadas a PCR pode ser positiva durante todo o embarazo	
Tipo de mostras	**Cultivo**	Soro	Soro e ouriños	Soro preferentemente, sangue total, tecidos, LCR
	PCR	Soro preferentemente	Soro e ouriños	Soro preferentemente, sangue total, tecidos, LCR
			En neonatos, mortinatos ou abortos: sangue, sangue de cordón umbilical, líquido amniótico (tamén en xestantes), placenta, tecido cerebral. En neonatos, se é complicada a obtención de soro valorarase recoller saliva	
		Se hai síntomas neurolóxicos: LCR e soro	Se hai síntomas neurolóxicos: LCR, soro e ouriños	
	Seroloxía	Soro	Soro	Soro
Conservación das mostras	Se a chegada ao laboratorio se prevé sexa < 24 h, refrixeración (2-8 ºC). Se o tempo pode ser >24 h. conxelación. Recoméndase recoller a mostra o día do envío ao laboratorio. Evitar conxelar/desconxelar			