


NOVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH EN HOMES (2004-2014)

As relacións sexuais sen preservativo en homes que teñen sexo con homes (HSH) é a vía máis importante de transmisión do VIH en Galicia tanto polo número de casos que produce como pola tendencia ao aumento (incremento anual do 8% en 2004-2014) aínda que se observa un descenso marcado en 2014.

Porcentaxe de novos diagnósticos de VIH segundo as principais categorías de transmisión en homes. Galicia 2004-2014.



(DXSP: datos o 31 de decembro de 2014)

Número de novos diagnósticos de VIH en HSH. Galicia, 2004-2014.



(DXSP: datos o 31 de decembro de 2014)

A maioría dos casos diagnósticanse entre os 25 e os 45 anos e residen principalmente nas provincias da Coruña e Pontevedra. O 41% destes homes levaban varios anos infectados polo VIH sen o saber e o seu sistema inmunitario xa estaba bastante deteriorado (menos de 350 linfocitos CD4/microlitro de sangue) no momento do diagnóstico. Na seguinte táboa obsérvase como este atraso diagnóstico aumenta a medida que aumenta a idade do home diagnosticado.

Porcentaxe de diagnósticos tardíos (DT) de VIH en HSH segundo a idade no momento do diagnóstico. Galicia, 2004-2014

	Porcentaxe de DT de VIH en HSH
menores de 25 anos	26 %
de 25 a 34 anos	32 %
de 35 a 44 anos	43 %
de 45 a 54 anos	57 %
maiores de 54 anos	79 %

(DXSP: datos o 31 de decembro de 2014)

A supervivencia das persoas con VIH mellorou moito coa introdución dos tratamentos antirretrovirais de alta eficacia, pero esta segue a ser unha patoloxía grave que non ten cura. Os últimos datos sobre mortalidade por VIH indican que, en 2013, morreron 54 persoas por VIH, das cales o 76% eran homes e a idade media das persoas falecidas foi de 47 anos.

Mortalidade polo VIH en homes. Galicia, ano 2013 (datos provisionais)

	Defuncións totais	Defuncións polo VIH/sida	Defuncións polo VIH/sida (‰)	Taxa de mortalidade VIH/sida
Homes	15.223	41	2,7	3,1

(DXSP: datos o 31 de decembro de 2014)

Para máis información pincha aquí: <http://www.sergas.es/Saude-publica/Informes-epidemioloxicos-de-VIH-sida>

SÍFILIS E GONOCOCIA DUNHA REDE DE CENTROS ESPAÑOIS DE ITS (2005-2011)

O mecanismo de transmisión máis frecuente da sífilis e gonococia foron as relacións sexuais entre homes. O 70% dos diagnósticos de sífilis e o 52% dos casos de gonococia producíronse por relacións sexuais entre homes homosexuais. A transmisión oral, tanto na sífilis como na gonococia, foi relevante xa que o 30% dos casos en HSH producíronse exclusivamente por vía oral e o 50% aproximadamente por vía oral e anal.

Distribución dos diagnósticos de sífilis e gonococia segundo a categoría de transmisión. España, 2005-2011

Mecanismo de transmisión	Sífilis		Gonococia	
	Nº	Porcentaje	Nº	Porcentaje
Relaciones homosexuales no protegidas	2476	69,5	1950	52,2
Relaciones heterosexuales no protegidas	863	24,2	1630	43,6
Relaciones bisexuales no protegidas	183	5,1	127	3,4
No consta información	39	1,1	29	0,8
TOTAL	3561	100	3736	100

Distribución dos diagnósticos de sífilis e gonococia segundo a práctica sexual. España, 2005-2011

Práctica sexual	Sífilis		Gonococia	
	Nº	Porcentaje	Nº	Porcentaje
Hombres que tienen sexo con hombres				
Anal	116	5,3	189	11,1
Oral	632	29,0	584	34,2
Anal+Oral	1212	55,5	783	45,8
No consta información	222	10,2	154	9,0
TOTAL	2182	100	1710	100
Heterosexuales				
Vaginal	288	35,9	330	22,5
Anal	1	0,1	13	0,9
Oral	28	3,5	242	16,5
Vaginal+Anal	14	1,7	46	3,1
Vaginal+Oral	254	31,7	574	39,2
Anal+Oral	5	0,6	11	0,8
Vaginal+Anal+Oral	67	8,4	105	7,2
No consta información	145	18,1	145	9,9
TOTAL	802	100	1466	100

Sin información de un centro en el periodo julio 2005 - diciembre 2009

Para más información pincha aquí: http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fd-vigilancias-alertas/fd-enfermedades/fd-sida/Informe_ITS_2005-2011.pdf