FAMOTIDINA

Contenido :

- Acción
- Indicaciones
- Posología
- Efectos adversos
- Precauciones
- Interacciones
- Observaciones al paciente
- Costes

Acción

Antiulceroso antihistamínico H2. Antagoniza competitivamente los receptores H2 de la histamina en las células parietales gástricas, reduciendo la secreción ácida gástrica y la liberación de pepsina. Su efecto comienza 1 hora después de tomarlo.

Indicaciones

- Tratamiento de la úlcera gástrica benigna y duodenal. Prevención de la recidiva de la úlcera gástrica benigna y duodenal.
- Tratamiento sintomático de la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) que no ha respondido a las medidas higiénico-dietéticas y a los antiácidos.
- Esofagitis por reflujo gastroesofágico
- Síndrome de Zollinger-Ellison.

Posología

Vía oral.

Úlcera duodenal y Úlcera gástrica benigna	Dosis inicial 20 mg/12h o 40 mg/noche durante 4-8 semanas, mantenimiento 20 mg/noche.(no hay estudios en periodos > a un año)
Reflujo gastroesofágico	20 mg/12h (tratamiento sintomático) o bien 40 mg/12h (en caso de esofagitis). Si a las 4-8 semanas de tratamiento no se obtiene respuesta es aconsejable realizar diagnóstico endoscópico
Síndrome de Zollinger-Ellison	Dosis inicial 20 mg/6h, que puede incrementarse según la respuesta del paciente, (pacientes sin trtamiento antisecretor previo).

Insuficiencia renal moderada o grave: es necesario un ajuste de dosis, bien reduciéndola a la mitad o incrementando el intervalo de dosificación a 36-48 h según la respuesta clínica de cada paciente.

Efectos adversos

Generalmente bien tolerado, sus efectos suelen ser leves, reversibles y poco frecuentes.

- **Sistema nervioso:** cefalea, (la mas frecuente, aproximadamente el 5%.), mareo.
- **Aparato digestivo**: diarrea y estreñimiento.

Precauciones

- **Insuficiencia renal:** ajustar según posología.
- **Interferencia en el diagnóstico de carcinoma:** la famotidina puede retrasar el diagnóstico de un carcinoma gástrico o esofágico porque enmascara sus síntomas.
- **Interferencia en pruebas alérgicas:** puede inhibir la respuesta histamínica en las pruebas alérgicas cutáneas..
- **Embarazo:** No se ha observado efecto teratógeno o sobre el neonato. Antes de utilizar famotidina en la embarazada, deben sopesarse los beneficios potenciales frente a los posibles riesgos.
- **Lactancia:** se distribuye en la leche materna. Se recomienda suspender la lactancia o el tratamiento.

Interacciones

No hay interacciones medicamentosas de especial relevancia clínica.

- **Antiácidos:** reducen la absorción de famotidina. Se recomienda separar las tomas 1-2 horas.

Observaciones al paciente

Cuando es dosis única, tomar los comprimidos por la noche.

Costes

Coste tratamiento/día **(Úlcera duodenal y Úlcera gástrica benigna, Reflujo gastroesofágico)** : 0.35
Se utiliza para el cálculo el medicamento de menor precio.

Aviso Legal